

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ



Вирус передается от человека к человеку:

Половым путем через жидкости организма, которые содержат ВИЧ:

- сперму;
- вагинальные выделения.

Парентеральным путем (через кровь):

- инфицированные кровепродукты и препараты крови;
- загрязненные иглы;
- общие иглы для нанесения татуировок;
- общие инструменты для бритья.

Вертикальным путем от инфицированной матери ребенку:


- во время беременности и родов;
- при кормлении грудью.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЛОВОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

В — воздержание.
Способ сам по себе хорош, так как практически исключает заражение. Но сами понимаете...

В — верность.
Способ хорош, если Вы уверены в себе и в своем партнере.

П — презерватив.
В определенных жизненных ситуациях может возникнуть необходимость использования презерватива, который снизит вероятность передачи ВИЧ.



ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ЧЕРЕЗ КРОВЬ



- Употребление наркотиков очень опасно, особенно инъекционных, так как может привести к заражению ВИЧ через нестерильные инструменты, наркотик.
- Нанесение татуировок, пирсинг следует делать в косметических салонах.

СИМПТОМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Симптомы ВИЧ-инфекции появляются по мере развития заболевания и снижения иммунитета:

- увеличение группы лимфоузлов (затылочных, шейных, подмышечных);
- потеря веса;
- лихорадка;
- длительная диарея;
- часто повторяющиеся ангины;
- заболевания кожи;
- поражения пищеварительного тракта, легких, головного мозга.



ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

- Основа любой семьи — уверенность в партнере. Чтобы быть уверенными, перед вступлением в брак целесообразно пройти тест на ВИЧ.
- Здоровье ребенка — залог семейного счастья и зависит только от родителей. Будущей маме необходимо пройти тест на ВИЧ, чтобы быть уверенной в здоровье ребенка.



ЧТО ТАКОЕ ВИЧ И СТИД?



ВИЧ — Вирус Иммунодефицита Человека.

ВИЧ-инфекция — заболевание,
вызываемое ВИЧ.

СТИД — Синдром Приобретенного
Иммунодефицита Человека, конечная
стадия ВИЧ-инфекции.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ



Для получения достоверного результата обследование лучше пройти через 3-6 месяцев после возможного заражения.

Перед тем, как сдать анализ, можно пройти дотестовое консультирование, во время которого объясняется:

- что такое ВИЧ,
- чем он отличается от СПИДа,
- каковы пути передачи ВИЧ,
- как и для чего проводится тот или иной анализ,
- что будет означать результат.

Когда получен результат анализа на ВИЧ, проводится посттестовое консультирование, где объясняется:

- что означает результат анализа,
- к чему он обязывает,
- что делать дальше.