

Во всех случаях насилия над  
детьми

**75-90% насильников**

**знакомы жертвам,**  
и только в 10-25% случаев  
насилие совершается  
незнакомыми людьми

Как правило сексуальному  
принуждению в семье  
подвергаются девочки и  
мальчики 5-15 лет



Большинство виновников –  
это отцы, отчимы, дяди,  
хорошие друзья семьи, а  
также старшие братья

## ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ БУДЕТ ЛЕГЧЕ, ЕСЛИ:

- в дошкольных, школьных, специализированных учреждениях осознают проблемы насилия над ребенком;
- налажено взаимодействие между специалистами образования, здравоохранения, социальной и правоохранительной сферы;
- специалисты умеют замечать признаки насилия.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ –  
ЗВОНИТЕ НА  
ДЕТСКУЮ ТЕЛЕФОННУЮ  
ЛИНИЮ

**8-801-100-1611**  
(КРУГЛОСУТОЧНО)

ПО ВСЕМ СЛУЧАЯМ НАСИЛИЯ  
НАД ДЕТЬМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ  
ПО ТЕЛЕФОНУ ПРЯМОЙ  
ЛИНИИ МВД

**8 -017-372-73-87**  
ЛИБО ПО ТЕЛ. 102

Составитель:  
Библиограф II категории Коралькова Е. П.

ГУК «Мозырская центральная  
районная библиотека  
имени А.С. Пушкина»  
Отдел обслуживания и информации

## НЕДОСТОЙНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ



## СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

2023

Информация для  
родителей и специалистов,  
работающих с детьми

## СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ -

вовлечение зависимых, незрелых в развитии детей и подростков в сексуальную деятельность, которую они не понимают и на которую они не в состоянии дать осознанное согласие, или которая нарушает социальные табу семейных ролей. По отношению к ребенку это любая активность сексуального плана, которая превышает нормы общения с ним.

## СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ -

это удовлетворение половой страсти с ребенком против его желания в условиях, когда ребенок не в состоянии отказаться от этого и защитить себя вследствие неравенства физических сил.

В случае сексуального насилия можно обнаружить как физические признаки, так и изменения в поведении ребенка

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

- порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье;
- гематомы в области половых органов;
- гематомы на груди, ягодицах, нижней части живота, бедрах;
- боль в животе, головная боль;
- повторяющееся воспаление мочепускающих путей;
- венерическая болезнь;
- беременность.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА

Изменения в выражении сексуальности ребенка:

- чрезмерный интерес к играм сексуального содержания;
- поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;
- соблазняющее поведение по отношению к противоположному полу;

- необычная сексуальная активность: частое раздражение половых органов.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ РЕБЕНКА

- замкнутость;
- депрессивность, грустное настроение;
- частая задумчивость;
- истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля;
- трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними.

Изменения самосознания ребенка:

- снижение самооценки;
- мысли о самоубийстве, попытки самоубийства.

Появление страхов:

- боится остаться в помещении наедине с определенным человеком;
- боится раздеваться, поэтому, например, может категорически отказаться от участия в занятиях по гимнастике;
- панически боится снимать трусики во время медицинского осмотра.